

# **RVPS Liptovský Mikuláš informuje občanov a chovateľov hydiny a vtákov o nepriaznivej nákazovej situácii – vtáčia chrípka.**

**V SR boli do dnešného dňa potvrdené ohniská vtácej chrípky v okresoch Trnava, Galanta a 2x v okrese Tvrdošín.**

**Jednalo sa o voľne žijúce vtáky ako aj vtáky chované v zajatí vrátane hydiny.**

**Chovatelia majú zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť chovov vtákov a hydiny.**

## **1. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým:**

- a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.),
- b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi); ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo,
- c. voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
- d. pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce (predovšetkým sťahovavé vodné) vtáctvo (tj. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu,
- e. oznamovať na RVPS Liptovský Mikuláš (tel. 044/5523814, 0904131041) akékoľvek príznaky vtácej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:
  - pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
  - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  - akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.